

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20010063
Разрешение №	11-14240/02.08.2011
Одобрение №	/

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВИНПОЦЕТИН КОВЕКС 5 mg таблетки VINPROSETINE COVEX 5 mg tablets

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го претостъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Винпоцетин Ковекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Винпоцетин Ковекс
3. Как да приемате Винпоцетин Ковекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Винпоцетин Ковекс
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИНПОЦЕТИН КОВЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Винпоцетин е синтетичен дериват на Vincamine.

Винпоцетин изборително подобрява мозъчното кръвообращение; активира мозъчния метаболизъм като подобрява снабдяването на мозъка с кислород и глюкоза; увеличава регионалния кръвоток; понижава налягането в кръвоносните съдове.

Винпоцетин предпазва тромбоцитите от агрегация, подобрява мозъчната микроциркулация и кръвния вискозитет чрез увеличение на еластичността на кръвните клетки, повишава устойчивостта на мозъчните клетки към хипоксия и/или исхемия.

- ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВИНПОЦЕТИН КОВЕКС

В неврологията: За лечение на различни форми на мозъчни циркулаторни нарушения, обуславени от атеросклероза, артериална хипертония, захарен диабет, васкулити и други.

Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение, транзиторни исхемични нарушения, мозъчни инфаркти, състояния след мозъчен инсулт, деменция от съдов произход, мозъчна артериосклероза, посттравматична и хипертонична енцефалопатия, вертебробазиларна недостатъчност,

За намаляване на психичните или неврологичните симптоми на мозъчните циркулаторни нарушения.

В офталмологията: За лечение на хронични съдови нарушения в хориоидеята и ретината.

В отологията: За лечение на пресбиакузис от перцептивен тип, болест на Meniere, шум в ушите.

В гинекологията: За намаляване на съдововегетативните симптоми при климактеричен синдром.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ВИНПОЦЕТИН КОВЕКС

Не трябва да използвате Винпоцетин Ковекс в следните случаи:

- Свръхчувствителност към лекарственото вещество, Винка – алкалоидите (винкристин, винбластин) или някое от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.
- Бременност и кърмене.
- Пресен мозъчен кръвоизлив. Интракраниална хипертензия.
- Винпоцетин не би трябвало да се прилага при деца.

Предупреждения и предпазни мерки:

Да се прилага внимателно при болни със сърдечна аритмия и при такива, приемащи хипотензивни средства.

Бременност, кърмене и фертилитет:

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Лечението с Винпоцетин Ковекс по време на бременност и при кърмене е противопоказно.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Това лекарство, при определени дози може да промени възможностите за реакции, особено при употребата му заедно с алкохол.

Други лекарства и Винпоцетин Ковекс?

Моля, уведомете лекуващия си лекар за ВСИЧКИ лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или сте ги купили без рецепта.

Не са изключени взаимодействия с хипотензивни, антиаритмични и антикоагулантни препарати. При лечение с Винпоцетин Ковекс и някой от тези медикаменти, болните трябва да бъдат внимателно мониторирани.

Досега не са известни клинично значими взаимодействия на Винпоцетин Ковекс с други лекарства.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВИНПОЦЕТИН КОВЕКС:

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар. Важно е да вземате лекарството така, както лекарят Ви го е предписал. Не трябва да промените дозите или да преустановите лечението, без да се консултирате преди това с лекаря, дори ако се чувствате добре.

Винпоцетин Ковекс се приема през устата с вода.

Дневната доза е 1 - 2 таблетки от 5 мг. три пъти дневно, максимум за 30 дена, след което 1 таблетка три пъти дневно за по-продължително време.

Ако вземете повече Винпоцетин Ковекс, отколкото трябва:

Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, посъветвайте се с лекуващия си лекар.

Ако сте пропуснали да вземете Винпоцетин Ковекс:

Ако сте пропуснали да вземете една доза, вземете е колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не прилагайте двойна доза, за да



компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както ви е предписано от лекуващия Ви лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По време на употребата на Винпоцетин Ковекс могат да възникнат следните нежелани реакции:

- От страна на сърдечно-съдовата система: леко намаление на кръвното налягане и не толкова често аритмии или екстасистоли, рядко тахикардия. Винпоцетин увеличава продължителността на електрическа възбудимост на сърдечната камера (QT- интервал).

- Храносмилателна система : гастроинтестинални нарушения като диспепсия, коремни болки или гадене.

- Централна нервна система: нарушения на съня, нервност, тревожност, главоболие, дори понякога може да се наблюдава и световъртеж. Много рядко: парестезии (сетивни нарушения под формата на изтръпване и др.)

- Кожа: в редки случаи може да възникне пруритус (сърбеж) или екзантем (обриви).

Съобщавайте на лекуващия лекар за всички наблюдавани от Вас нежелани лекарствени реакции при прием на лекарството, дори и такива, които не са включени в дадената информация!

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИНПОЦЕТИН КОВЕКС:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° C.

Лекарството не трябва да се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Винпоцетин Ковекс:

- Активновещество: Винпоцетин 5 мг

Другите съставки са: лактоза, частично заместена хидроксипропилцелулоза (LH-21), магнезиев стеарат и талк

Как изглежда Винпоцетин Ковекс и какво съдържа опаковката:

Бели, кръгли таблетки с делителна черта от едната страна и логото на Ковекс от другата.

Таблетките са опаковани в блистер по 25 таблетки от PVC/алуминиево фолио, по 1 или 2 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ: По лекарско предписание!

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба: COVEX S.A., C/ Acero 25, Poligono Industrial Sur - 28770 Colmenar Viejo (Madrid), Испания

Производител: KERN PHARMA, S.L., C/ Venus, 72; Poligono Industrial Colón II, 08228 Terrasa (Barcelona), Испания

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА: Февруари 2011 г.

